

# БЕШЕНСТВО

**БЕШЕНСТВО НЕИЗЛЕЧИМО, НО БОЛЕЗНЬ МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ!**

## Как происходит заражение?

Болезнь передается от больных бешенством диких (лисы, волки, шакалы) и домашних (собаки, кошки, коровы, лошади, свиньи) животных человеку:



- при укусе или оцарапывании человека больным бешенством животным;
- при попадании слюны больного животного на поврежденную кожу или слизистые оболочки человека

### Меры профилактики бешенства:

- соблюдение правил содержания домашних собак и кошек: регистрация и учет в ветеринарной службе, применение намордников, содержание на привязи и т.л.
  - обязательная ежегодная профилактическая иммунизация против бешенства собак и кошек;
- Также необходимо:**
- при появлении признаков заболевания показать животное специалисту - ветеринару;
  - самостоятельно не оказывать помощь заболевшему животному;
  - не разрешать детям трогать чужих собак, кошек и других животных.

### Признаки заболевания бешенством животных:

- изменение поведения животного: злые животные становятся ласковыми, ласковые – агрессивными;
- появление светобоязни: животные забиваются в темный угол, не идут на зов хозяина
- отказ от пищи: хватают и глотают несъедобные вещи;
- появление затруднения глотания, обильное слюнотечение, возбуждение и агрессивность, отсутствие голоса, обездвиженность задних конечностей

**Помните! Каждый владелец домашних животных несет ответственность за своих питомцев!**

## Бешенство

Бешенство – это крайне опасное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением головного и спинного мозга. Оно часто заканчивается летальным исходом. Бешенство встречается у всех млекопитающих и передается с биологическими жидкостями, в основном со слюной. Человек, как правило, заражается им в результате укуса инфицированного животного. От человека к человеку заболевание не

переходит. Людям, входящим в группу риска развития бешенства, необходимо проходить вакцинацию. Распространенность бешенства зависит от степени вакцинированности домашних животных. Наиболее распространено оно в сельской местности и чаще возникает в летний период.

На начальном этапе заболевание проявляется усиленным слюноотделением и боязнью воды, а также угнетенным состоянием, которое сменяется приступами агрессии и возбуждения. К сожалению, появление симптомов заболевания неизбежно заканчивается летальным исходом, так что лечение предполагает лишь облегчение состояния больного.

## **Симптомы**

Обычно бешенство не вызывает никаких симптомов вплоть до последней стадии заболевания, когда лечение уже невозможно. Инкубационный период (от заражения до появления симптомов) составляет от 7 дней до 1 года, в среднем 20-90 дней. Признаки заболевания часто появляются за несколько дней до смерти больного:

- перед появлением основных симптомов на месте укуса может возникать припухлость, покраснение, зуд,
- лихорадка,
- головная боль, недомогание,
- потеря аппетита, тошнота, рвота, понос,
- беспокойство, нарушения сна,
- депрессия,
- повышенная чувствительность к слуховым, зрительным раздражителям,
- угнетенное состояние сознания, тревожность, апатия сменяются приступами возбуждения, беспокойства, агрессии. Приступы возбуждения при этом сопровождаются учащением дыхания и сердцебиения,
- расстройства дыхания и глотания,
- гидрофобия – боязнь воды (при разговоре о ней или при попытке попить больной испытывает ужас, у него возникают болезненные спазмы глотки и гортани),
- чрезмерное слюноотделение,
- галлюцинации,
- судороги,
- частичный паралич.

## **Лечение**

Специфического лечения бешенства не существует. Как правило, заболевание неизлечимо и приводит к летальному исходу. Смерть обычно

наступает в результате поражения дыхательного центра, что влечет за собой остановку дыхания.

При укусе дикого животного проводится промывание, тщательный осмотр на предмет инородных тел (например, сломанных зубов) и хирургическая обработка раны. Затем срочно вводятся иммуноглобулины – специальные клетки иммунной системы. Далее в течение двух недель проводится вакцинирование пациента (всего применяется 5 вакцин). Только этот способ позволяет предотвратить заболевание.

После укуса за домашним животным необходимо наблюдать в течение примерно 10 дней и при появлении симптомов бешенства срочно обратиться к врачу для принятия мер по иммунизации пациента. Источник бешенства – больное животное – необходимо изолировать.

### **Профилактика**

- Людям, входящим в группу риска развития бешенства, следует обязательно пройти вакцинацию.
- После укуса дикого животного необходимо тщательно промыть рану водой с мылом и срочно обратиться к врачу, чтобы пройти курс иммунизации и вакцинации против бешенства.
- Профилактическая вакцинация домашних животных.
- Домашних животных следует держать дома и контролировать их при нахождении на улице.
- Следует соблюдать правила общения при встрече с бродячими животными – не трогать их, не гладить во избежание укуса.
- Необходимо избегать контакта с дикими животными (например, лисами). Здоровые дикие животные сами избегают людей, поэтому зверь, который не боится людей и не пытается убежать, должен вызвать подозрение.
- Поводом для обращения к врачу может стать и укус домашнего животного, например в случае если вы не знаете, может ли быть оно заражено бешенством, и тем более если животное в течение нескольких дней после укуса погибло.

**При появлении первых признаков болезни у животных незамедлительно проинформировать ветеринарную службу района.**